



Единый день здоровья

Информационный бюллетень
отдела общественного здоровья



25 апреля
2019 года

Всемирный день борьбы с малярией

Обратите внимание:

По данным ВОЗ:

2017 г. малярией заболели 219 миллионов человек в 87 странах;

в 2017 г. малярия стала причиной смерти 435 000 человек;

свыше 90% глобального бремени малярии приходится на страны Африки;

каждые две минуты от малярии умирает один ребенок;

каждый год регистрируется более 200 миллионов новых случаев заболевания

К сведению:

Глобальная техническая стратегия ВОЗ борьбы с малярией на 2016-2030 гг. ставит задачи к 2030 году:

сокращение не менее чем на 90% показателей заболеваемости малярией;
сокращение не менее чем на 90% показателей смертности от малярии;

элиминацию малярии не менее чем в 35 странах;

предупреждение повторного появления малярии во всех свободных от малярии странах

В рамках Всемирного дня борьбы с малярией ВОЗ совместно с Партнерством «Вместе против малярии» – обратим вспять малярию» и другими организациями проводит массовую информационно-просветительскую кампанию «**Нулевой уровень смертности от малярии начинается с меня**», целью которой является сохранение за проблемой малярии статуса политического приоритета, мобилизация дополнительных ресурсов и расширение возможностей сообществ вести само-

стоятельную работу по профилактике и лечению малярии.



Малярия – это угрожающее жизни заболевание; вызывается паразитами и передается человеку в результате укусов инфицированных самок комаров.

После укуса инфицированного комара симптомы острого лихорадочного заболевания появляются через 7 и более дней. Первые симптомы (лихорадка, головная боль, озноб и рвота) могут быть слабовыраженными, что затрудняет выявление болезни. Если не начать лечение в течение первых 24 часов, может развиваться тяжелая форма, часто заканчивающаяся летальным исходом.

Ранняя диагностика и лечение малярии способствуют уменьшению тяжести болезни и предотвращению смерти.

Профилактика малярии

Профилактика малярии проводится по двум направлениям: предупреждение заражения и профилактика заболевания.

Предупреждение заражения – это защита помещений от проникновения переносчиков (засетчивание окон) и защита от их укусов (установка прикроватных марлевых полог, уничтожение залетевших комаров инсектицидными средствами с помощью электроиспарителей-фумигаторов); вне помещения – обработка открытых участков те-

ла отпугивающими препаратами – репеллентами.

Использование обработанных инсектицидом противомоскитных сеток для сна может уменьшить возможность контакта между комарами и человеком путем создания как физического барьера, так и инсектицидного эффекта.

Профилактика заболевания – это прием, назначенных врачом лекарственных препаратов, начиная за неделю до выезда в

неблагополучный по тропической малярии регион, весь период пребывания там и еще 4-6 недель после возвращения домой.

В течение трех лет после возвращения из неблагополучной по малярии страны при каждом обращении в учреждение здравоохранения по поводу любого заболевания, повлекшего повышение температуры, следует информировать лечащего врача о своем пребывании в малярийном очаге.